

Checklist aanbevelingen orale oncolytica

Deze checklist bevat aanbevelingen voor **orale oncolytica die een stopperiode hebben en/of gedoseerd worden op lichaamsgewicht of lichaamsoppervlak**.

Wij bevelen u aan de punten uit deze checklist mee te nemen in uw werkoverleg en afspraken hierover vast te leggen.

Algemene aanbevelingen:

- ☐ Controleer de instellingen van uw (Z)AIS op de volgende punten:
 - een waarschuwingssignaal bij aanschrijven 'Let op dosering + mogelijk stopperiode oncolyticum'. Indien niet aanwezig, vraag na bij softwareleverancier!
 - weergave van vrije tekst in geprinte documenten (bv. toedienlijst)
- ☐ T.a.v. patiënten met een weekdoseersysteem: Beoordeel per patiënt of het verantwoord is het geneesmiddel in een weekdoseersysteem te verwerken of in eigen beheer te hebben.
- ☐ Accepteer nooit een recept met 'gebruik bekend', 'gebruik volgens schema', onvolledige dosering of zonder gebruikspanne.
- ☐ Controleer dosering (mg/m^2), doseerregime en gebruikspanne altijd handmatig:
 - aan de hand van gebruikt behandelprotocol/ doseerschema
 - aan de hand van actueel gewicht (en lengte)
 - laat dosering door 2^e gekwalificeerd persoon controleren
- ☐ Wees alert op interacties, vraag ook het gebruik van vrij verkrijgbare geneesmiddelen na.
- ☐ Besteed aandacht aan deskundigheidsbevordering met betrekking tot de orale oncolytica.

Aanbevelingen voor openbaar apotheek/ poliklinische apotheek:

- ☐ Verifieer een recept voor een oraal oncolyticum dat is voorgeschreven door een huisarts.
- ☐ Vraag bij de patiënt na of hij het geneesmiddel eerder heeft gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst.
- ☐ Vermeld op het etiket de gebruikspanne ('gedurende ... dagen') en de lengte van de stopperiode ('daarna ... weken stoppen').
- ☐ Voorkom dat oncolytica tijdens de stopperiode uit de medicatiebewaking verdwijnen.
- ☐ Lever het juiste aantal tabletten af voor maximaal 1 kuurperiode.
- ☐ Lever pas af ná controle door de apotheker.
- ☐ Informeer patiënt/mantelzorg goed over gebruik in kuurperioden afgewisseld met perioden waarin het geneesmiddel niet wordt gebruikt.

Aanbevelingen voor ziekenhuisapotheek:

- ☐ Beschrijf alle kuren oncolytica in kuurschema's en vergelijk elke aanvraag qua dosis en tijdschema met deze vastgelegde schema's.
- ☐ Lever het juiste aantal tabletten af voor maximaal 1 kuurperiode.
 - Registreer de datum van uitgifte
- ☐ Farmaceutisch ontslaggesprek:
 - Ga na of de patiënt in staat is de medicatie in eigen beheer te kunnen gebruiken.
 - Informeer patiënt/mantelzorg goed over gebruik in kuurperioden afgewisseld met perioden waarin het geneesmiddel niet wordt gebruikt.

Aanbevelingen t.a.v. medicatieoverdracht:

- ☐ Maak zo min mogelijk gebruik van vrije tekstregels
- ☐ Controleer of dosering, kuur- en stopperiodes op een juiste manier worden gecommuniceerd.
- ☐ Maak afspraken over overdracht van gegevens:
 - Bij opname in het ziekenhuis: zorg dat minimaal het gebruikte doseerschema, de dosering, kuur- en stopperiode bekend zijn.
 - Bij ontslag uit het ziekenhuis: zorg dat minimaal het gebruikte doseerschema, de dosering, kuur- en stopperiode gecommuniceerd worden naar apotheek, huisarts en evt. verpleeg-/verzorgingshuis van de patient.
 - Maak afspraken m.b.t. het afleveren van medicatie voor patiënten die medicatie met een weekdoseersysteem krijgen:
 - a) wie levert af?
 - b) wie beheert de medicatie van de patient?